

# રાજકોટ મહાનગરપાલિકા - આરોગ્ય શાખા - મેલેરિયા વિભાગ



સ્વચ્છ  
સર્વેક્ષણ  
લીગ 2૦૨૦

રાષ્ટ્રીય વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ

ડૉ. આંનેહરભાઈન રૂમ નં. ૬, ત્રીજો માળ, બસ સ્ટેન્ડની પાસે,  
દેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૨.

☎ : 0281 - 2237062

✉ : biologist\_rmc@yahoo.in

👍 Like us on Facebook : /malaria.department

તા. ૧૫/૦૫/૨૦૨૦

## અખબાર યાદી

પ્રતિ,  
તંત્રીશ્રી,

<b>૧૬ મે, "રાષ્ટ્રીય ડેન્ગ્યુ દિવસ" :</b> ડેન્ગ્યુ વિશે જાણીએ તથા સ્વયંને તથા પરિવારને ડેન્ગ્યુથી સુરક્ષિત કરીએ.	
ડેન્ગ્યુ ફેલાવતા એડિસ ઈજીપ્તી મચ્છર ચોખ્ખા અને સ્થિર પાણીમાં ઇંડા મુકે છે. ઇંડામાંથી મચ્છર બનતા ૭ થી ૧૦ દિવસનો સમય લાગે છે ત્યાર બાદ ચેપી મચ્છરના કરડયા પછી ૭ થી ૧૦ દિવસ બાદ ડેન્ગ્યુના લક્ષણ દેખાય છે.	
સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બર થી નવેમ્બર માસ દરમિયાન ડેન્ગ્યુના કેસો જોવા મળે છે.	ડ્રેનેજના પાણી, એઠવાડ, ઉંગી નીકળેલ ઘાસ, કાદવ કિચડ, કચરાના ઢગલા વગેરેમાં ડેન્ગ્યુના એડિસ ઈજીપ્તી મચ્છર ઉત્પન્ન થતા નથી.

ડેન્ગ્યુ રોગ વિશે જાગૃતતા લાવવા તથા ટ્રાન્સમિશન સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં દેશમાં રોગના નિયંત્રણ માટે નિવારક પગલાંને વેગ આપવા ભારત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયની ભલામણ સાથે ૧૬ મી મેના રોજ 'રાષ્ટ્રીય ડેન્ગ્યુ દિવસ'ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

ડેન્ગ્યુ ફિવર (ડીએફ) એ વિષાણું (વાયરસ) થી થતો અને મચ્છર દ્વારા ફેલાતો રોગ છે. ડેન્ગ્યુ ફિવરના ગંભીર પ્રકારને ડેન્ગ્યુ હેમરેજીક ફિવર (ડી.એચ.એફ.) અને ડેન્ગ્યુ શોક સીન્ડ્રોમ (ડીએસએસ) તરીકે ઓળખાય છે. ડેન્ગ્યુ તાવના વાયરસ ફ્લેવી વાયરસ પ્રકારના છે અને તે સીરોટાઇપ ૧, ૨, ૩ અને ૪ (ડેન્ગ્યુ ૧, ૨ ૩ અને ૪ ) તરીકે ઓળખાય છે.

ડેન્ગ્યુનો મચ્છર (એડિસ) ચોખ્ખા પાણીમાં ઘરની અંદર રહેલ નાના - નાના પાત્રોમાં ઇંડા મુકે છે. તેના પોરા પાણીમાં ખુણો બનાવીને, જાણે ઊંધે માથે લટકતી સ્થિતિમાં તરે છે. તેને નરી આંખે સહેલાઈ થી જોઈ શકાય છે. આ મચ્છર ટાઈગર મચ્છર તરીકે જાણીતો છે, રંગે કાળો અને શરીરના પ્રુશ્ક ભાગ પર સફેદ રંગના ટપકા ધરાવે છે, અને આ મચ્છર ચેપી હોય તો ડેન્ગ્યુનો રોગ ફેલાવે છે. જ્યાં ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાં જ રોગ ફેલાવે છે. તેની ઉડચન ક્ષમતા ઓછી, આશરે 100 મીટર હોવાથી, આ મચ્છર ઘર કે કાર્યસ્થળે પાણીના સંગ્રહસ્થાનોમાં ઇંડા મુકતા જોવા મળે છે.

### ડેન્ચુના લક્ષણો :-

- સખત તાવ
- માથાના આગળના ભાગમાં દુખાવો અને કમરમાં દુખવો.
- આંખની પાછળ દુખાવો જે આંખના હલનચલનથી વધે છે.
- સ્નાયુ અને સાંધાનો દુખાવો.
- છાતી અને હાથ પર ઓરી જેવા દાણા.
- ઉબકા-ઉલટી.
- ભુખ ન લાગવી અને બે સ્વાદ, કબજિયાત.

### ડેન્ચુની સારવાર :-

- તાવ દરમ્યાન સંપૂર્ણ આરામ.
- તાવ અને દુઃખાવા માટે ટેબ. પેરાસીટામોલ પણ ટેબ. એસ્પીરીન ન જ લેવાય.
- સખત દુઃખાવા માટે દર્દનાશક અથવા સામાન્ય ઘેન લાવનાર દવા આપવી.
- ઠંડા પાણીના પોતા મુકવાં, નબળાઈ, પુષ્કળ પસીનો કે ઝાડા અથવા ઉલ્ટી હોય તો ઓ.આર.એસ. દ્રાવણ, પુષ્કળ પ્રવાહી, ફળોનો રસ વગેરે.
- ડેન્ચુ હેમરેજીક ફિવર (ડીએચએફ) કે ડેન્ચુ શોક સીન્ડ્રમ (ડી.એસ.એસ.) માટે હોસ્પિટલાઈઝેશન કરાવવું.

એક સીરોટાઈપનો ચેપ લાગે તો તેના સામે કાયમી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ મળે છે. પણ બીજા સીરોટાઈપથી રક્ષણ મળતું નથી, પરંતુ બીજી વારના રોગના હુકમો ગંભીર સ્વરૂપ લે છે.

### રોગનો ફેલાવો :-

- (૧) ડેન્ચુ વાયરસનો ચેપ માણસમાં દિવસે કરડતા માદા એડિસ ઈજીપ્તી મચ્છર દ્વારા ફેલાય છે.
- (૨) ડેન્ચુ વાયરસના એકલ દોકલ કેસ સમગ્ર વર્ષ દરમ્યાન બનતા હોય છે. ડેન્ચુ વાયરસનું જીવનચક્ર મનુષ્ય અને મચ્છર બંનેમાં ચાલુ રહે છે.
- (૩) ડેન્ચુના દર્દીને જ્યારે માદા એડિસ ઈજીપ્તી મચ્છર કરડે છે ત્યારે ચેપ મચ્છરમાં ફેલાય છે અને ૮ થી ૧૦ દિવસમાં આ મચ્છર ચેપી બને છે. આવો મચ્છર આજીવન ચેપી રહે છે. માદા મચ્છર ૩ અઠવાડીયા સુધી સામાન્ય તાપમાનમાં જીવી શકે છે.
- (૪) એડિસ મચ્છરો ઘરમાં બારશાખમાં અને અન્ય અંધારી જગ્યામાં રહે છે.
- (૫) આ એડિસ ઈજીપ્તી મચ્છર આપણા ઘરમાં જ પાણી ભરેલ પાત્રો અથવા વરસાદી પાણી જમા થતુ હોય તેવી જગ્યાઓએ ઉત્પન્ન થાય છે જેમ કે.

- સીમેન્ટની ટાંકી
- સીડી નીચેની ટાંકી
- સિન્ટેક્ષની ટાંકી
- બેરલ, પીપ
- ટાયર, ડબ્બા ડુબ્લી વગેરે ભંગાર
- પક્ષીકુંજ

- પશુના પાણીના અવાડા
- નાળીયેરની કાછલી
- છોડના કુંડા, તેની નીચે રાખેલ પ્લેટ
- ફિજની પાછળની ટ્રે
- માટલા
- સુશોભન માટેના કુવારા

- અગાસી – છજજામાં જમા થતુ  
વરસાદી પાણી

- મનીપ્લાન્ટ, અન્ય પ્લાન્ટ માટેની  
કાયની બોટલ

વરસાદના વિરામ બાદ સ્થિર અને બંધિયાર ચોખ્ખા પાણીમાં એડિસ મચ્છર ઈંડા મુકે છે. આ ઈંડામાંથી પ્રથમ પોરા ત્યાર બાદ પ્યુપા તથા પુખ્ત મચ્છર બને છે. આમ ઈંડામાંથી પુખ્ત મચ્છર બનતા ૭ થી ૧૦ દિવસનો સમય લાગે છે.

એડિસ પુખ્ત મચ્છર જો ડેન્ગ્યુ વાઈરસથી ચેપી હોય તો ડેન્ગ્યુથી ચેપી બનેલ મચ્છરના કરડયા બાદ માણસના શરીરમાં વિષાણું દાખલ થયા પછી લીમ્ફ ગ્લાન્ડમાં તેની વૃદ્ધી થાય છે. વિષાણુઓના પુરતા પ્રમાણમાં વૃદ્ધી થયા બાદ વ્યક્તિને ૭ થી ૧૦ દિવસમાં ડેન્ગ્યુના લક્ષણો દેખાય છે. જેને ઈન્ક્યુબેશન પિરીયડ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે વરસાદ બાદ ૧૪ થી ૨૦ દિવસ બાદ ડેન્ગ્યુ રોગનો ફેલાવો ચાલુ થાય છે. આથી ડેન્ગ્યુ રોગ નિયંત્રણ માટે લોકોએ સ્વયંજાગૃત રહી ઘરની સફાઈ કરવી જોઈએ.

લોકોને ખાસ અપીલ છે કે દરેક નાગરિક ડેન્ગ્યુ નિયંત્રણ અંગેની આ ઝુંબેશમાં જોડાય. લોકોએ અઠવાડિયામાં ફક્ત ૧ વખત તેઓના ઘરમાં દરેક સ્થળે મચ્છરોના ઉદભવ સ્થાનોની સફાઈ કરવી.

- ઘરમાં દરેક સ્થળે અગાશીથી, ઘરની અંદર નવેરુ તથા ઘરની બહાર ઓસરી તથા શેરીમાં જ્યાં પાણી ભરેલ ટાંકી હોય અથવા પાણી એકઠુ થતુ હોય તેવા ઉપર દર્શાવેલ તમામ સ્થળ ચકાસી જો પાણી જમા રહેતું હોય તો પાણીનો નિકલ કરવો.
- પાણી સંગ્રહ કરવાના તમામ પાત્રો હવાચુસ્ત બંધ રાખવા.
- નળની કુંડીમાં પાણી ગયા બાદ સાવ કોરી કરી સાફ કરવી.
- ફિજની ટ્રે દર ત્રીજા દિવસે ખાલી કરી ઘસીને સાફ કરવી.
- વરસાદ બંધ થયા બાદ છોડના કુંડામાં જમા રહેતું વધારાનું પાણી ખાલી કરવું.
- બિનજરૂરી પક્ષીકુંજ ભરવા નહિં. જો ભરો તો દરરોજ પક્ષીકુંજને અંદરથી ઘસી સાફ કરવા.
- અગાસી, છજજા વગેરેમાં ટાયર તથા અન્ય ભંગાર ન રહે તેની તકેદારી રાખવી.

**રોગ અટકાયત એજ ઉત્તમ પગલુ છે.**

**એડીસ મચ્છરો આપણા માટે ખતરા સમાન છે, તેના ઉત્પત્તિ સ્થાનો નાબુદ કરીએ.**

**સૌ સાથે મળી ડેન્ગ્યુ સામે લડીએ.**

**આરોગ્ય અધિકારી  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા**